

※ 정확한 대장내시경 검사를 하기 위해서 아래와 같은 사전 준비에 세심한 주의가 필요하오니 검사 위해 전 숙지하시기 바랍니다

## ← 검사 전 주의 사항 (약 복용)

- 항응고제(아스피린, 아스트렉스, 와파린 등)는 검사하기 **일주일 전부터 복용을 중단** 해야 합니다.
- (약물 중단 가능여부는 반드시 주치의 의사와 상의해 주세요.)

\* **혈압약**을 복용하는 경우 검사당일 아침 안내된 시간에 물과 함께 복용 하십시오.

\* 검사당일 **단약 및 기타 약**은 복용하실 수 없습니다.

- 검사 전담 점심식사는 12시~1시정도 소화가 잘되는 음식이나 흰죽(만 그릇 정도)으로 드시고, 이후 **금식 금지** 하십시오.

## ← 대장내시경 약물 복용방법 (프로립산)



① **가소물액 1포**를 프로립산 복용 **10분전에** 복용 합니다.

② 프로립산 A제와 B제를 가위로 자르고 500ml 용기에 A제 한포를 넣은 다음 B제 한포를 넣습니다.

③ 500ml 표시선까지 물을 넣고 용액이 균질하게 용해되도록 흔들어 줍니다.

④ **조제한 프로립산액 500ml**를 두 번 나누어 복용합니다.

## 프로립산 복용 순서 및 복용시간

검사 전담 저녁	① 가소물 1포를 먼저 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용
저녁 8시~	① 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용
저녁 8시 30분~	① 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용
오전 5시~	① 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용
오전 5시 30분~	① 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용
오전 6시	① 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	② 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	③ 프로립산 (A제 1포+B1포)를 500ml에 섞어서 복용하세요.	④ 생수 500ml 복용

가능한 생수에 섞어 복용해주세요. (녹차, 커피, 보리차 등 색깔이 있는 음료를 제외)